

# 丙泊酚注射液说明书

宠物用

## 【兽药名称】

通用名称：丙泊酚注射液

商品名称：沛纷

英文名称：Propofol Injection

汉语拼音：Bingbafen Zhusheye

## 【主要成分】 丙泊酚

【性 状】 本品为白色的乳状液体。

## 【药理作用】

**药效学** 丙泊酚是一种用于诱导麻醉和麻醉维持的静脉注射镇静催眠药，诱导麻醉起效时间为75~120s。给予诱导剂量的丙泊酚后，犬麻醉维持时间平均为6.7min。给予麻醉维持剂量的丙泊酚后，无麻醉前给药的犬麻醉维持时间平均为3.68 min；麻醉前给予乙酰丙嗪的犬麻醉维持时间平均为3.80min；麻醉前联合给予乙酰丙嗪/羟吗啡酮的犬麻醉维持时间平均5.43min。丙泊酚麻醉恢复迅速，一般在20min内动物能完全恢复站立，使用麻醉前给药的动物恢复时间可能延长。

**药动学** 犬静脉注射丙泊酚后，与血浆蛋白结合率高，在体内可以迅速分布，具有高度亲脂性，能透过血脑屏障及胎盘屏障，可通过乳汁分泌。经肝脏代谢为无活性的结合物，经肾脏排泄。

**药物相互作用** 丙泊酚与阿托品、格隆溴铵、乙酰丙嗪、赛拉嗪、羟吗啡酮、氟烷和异氟醚联合使用，临床上未观察到药效学的相容性。

【适 应 证】 用于犬的诱导麻醉。

【用法与用量】 以丙泊酚计。静脉注射，单独应用时，每1kg体重，犬5.5mg，40~60秒注完。当有麻醉前给药时，给药剂量和给药速率参考下表或视患犬情况确定。

麻醉前给药	丙泊酚诱导剂量 (mg·kg <sup>-1</sup> )	给药时间 (秒)	给药速率	
			mg·kg <sup>-1</sup> ·min <sup>-1</sup>	ml·kg <sup>-1</sup> ·min <sup>-1</sup>
无	5.5	40~60	5.5~8.3	0.55~0.83
乙酰丙嗪	3.7	30~50	4.4~7.4	0.44~0.74
乙酰丙嗪/羟吗啡酮	2.6	30~50	3.1~5.2	0.31~0.52

## 【禁 忌 症】

1. 禁用于对丙泊酚及其辅料过敏的犬。

2. 禁用于不适合全身麻醉或镇静的犬。

## 【不良反应】

1. 丙泊酚快速给药或过量用药可能会引起心肺抑制，包括低血压、呼吸暂停和血氧饱和度下降。

2. 患犬偶尔会发生不常见或者很罕见症状：抑郁症、胃肠道反应、心血管抑制、癫痫样症状等。

## 【注意事项】

1. 本品使用期间，应保持犬呼吸道畅通并加强连续监护，确保人工通气和供氧可随时实施。当使用丙泊酚维持麻醉时，患犬有可能快速觉醒，应仔细对患犬进行监测，在给予丙泊酚麻醉维持剂量后可能会出现呼吸暂停；从丙泊酚诱导麻醉过渡到给予吸入麻醉剂维持麻醉时，需给予额外低剂量的丙泊酚进行过渡，过渡期给予丙泊酚剂量也可能可能会出现呼吸暂停；给予吸入麻醉剂维持麻醉时也可给予丙泊酚来提高麻醉的深度，在这过程中给予的丙泊酚也可能可能会出现呼吸暂停。

2. 本品必须由执业兽医使用。

3. 本品使用前应摇动混匀，只能使用溶液均匀和容器完好的产品。

4. 本品不含防腐剂，在处理本品时要严格遵守无菌技术。若怀疑药品被污染，应禁止使用。

5. 本品仅通过静脉注射给药。

广州市人民印刷厂股份有限公司				
客户名称	嘉博	尺 寸	162 x 257mm	请确认此稿尺寸、材质、 颜色、工艺 面版
品 名	丙泊酚注射液说明书	材 质	80g双胶纸	
版 号	2021070703	颜 色	■K	
模 号	-	工 艺	-	
制作日期	2021.07.07	文件路径	10.0.16.1\制作文件\2021070703	

开启后应立即将瓶内药液抽入无菌注射器，每支注射器仅用于同一个患犬。未使用的药品应在6小时内丢弃。给药前不得与其他治疗药物混合使用。

6.进行麻醉前给药可能增加丙泊酚的麻醉或镇静效果，并且收缩压、舒张压、平均动脉血压发生明显变化。

7.本品在孕犬和种犬中使用的安全性尚不明确。和其他全身麻醉药一样，本品可透过胎盘，并可能与新生犬的抑郁有关。

8.本品尚未在小于10周龄的犬进行使用评价。

9.老年或体弱的患犬使用本品的剂量需调整。本品对于肾功能衰竭和（或）肝功能衰竭的患犬的给药机制尚不明确。与其他麻醉剂合用时，应加强对心脏、呼吸、肾脏或肝脏损伤或低血容性患犬的监护。

10.本品对视觉猎犬具有较好的诱导麻醉和维持效果，但麻醉恢复时间会延长。

11.本品和其他麻醉药类似，可增加对肾上腺素诱发的室性心律失常的心肌敏感性。临床研究中使用丙泊酚进行诱导麻醉和麻醉维持的145只动物中，观察到有2只出现与丙泊酚有关的短暂室性心律失常。

12.犬外周血管注射本品不产生局部组织反应。

13.本品非人用药，请置于儿童不可触及处。

14.自我给药的罕见病例已被报告，包括死亡。应通过获取权限的限制和采取适合于临床背景的药物问责程序等措施，来预防转移的风险。

15.请小心使用，避免意外自我注射。药物过量可能会导致心肺抑制。出现呼吸抑制时应尽快将药物从人体接触部位清除，采取人工通

气和供氧治疗，并寻求医疗救助。

16.对肌松药过敏者可能对丙泊酚过敏，应谨慎使用本品，避免引起的过敏反应。

17.避免吸入本品，避免皮肤、眼睛直接接触本品。若不慎接触，使用大量的水冲洗15分钟。若存在持续刺激反应，请尽快就医。

18.本品不能冰冻。

【规格】 10ml: 100mg

【包装】 每盒5支。

【贮藏】 密闭，在2~25℃贮存。

【有效期】 36个月。

【批准文号】 兽药字191377109

【生产企业】

广东嘉博制药有限公司

生产地址：广东省清远市高新技术产业开发区生物医药城

电话：0763-3299257

网址：www.jiabopharm.com

广州市人民印刷厂股份有限公司				
客户名称	嘉博	尺寸	162 x 257mm	请确认此稿尺寸、材质、颜色、工艺 背版
品名	丙泊酚注射液说明书	材质	80g双胶纸	
版号	2021070703	颜色	■K	
模号	-	工艺	-	
制作日期	2021.07.07	文件路径	10.0.16.1\制作文件\2021070703	